BROȘURA PACIENTULUI

EURneffy 2 mg

(spray nazal cu adrenalină)

Versiune aprobată de ANMDMR în aprilie 2026

Cum să identificaţi o reacţie alergică severă

Utilizaţi EURneffy la primele semne ale unei reacţii alergice severe după expunerea la un alergen. Simptomele pot include:

- Mâncărimi ale pielii
- Erupţii în relief pe piele (precum cele provocate de urzici)
- Înroșire a feţei
- Umflare a buzelor, gâtului, limbii, mâinilor și picioarelor
- Respiraţie șuierătoare
- Răguşeală
- Dificultate la respiraţie
- Greaţă
- Vărsături
- Crampe la stomac
- Pierderea conștienţei
- Neliniște
- Bătăi rapide ale inimii
- Convulsii
- Diaree (scaune moi)
- Pierdere a controlului vezicii urinare

NU ezitaţi să utilizaţi deoarece severitatea simptomelor se poate schimba rapid.

Asiguraţi-vă că dumneavoastră, copilul dumneavoastră, familia, persoana care are grijă de dumneavoastră, colegii și profesorii, știu cum și când să utilizeze EURneffy .

ALK

072026



Depozitare și manipulare

Fiecare dispozitiv EURneffy pentru o singură utilizare conţine o doză de adrenalină, și este livrat într-un blister cu instrucţiuni de utilizare.

Este important să aveţi la dumneavoastră a 2-a doză, dacă este necesară.

EURneffy nu necesită condiţii speciale de păstrare. În caz de congelare accidentală, sprayul nazal nu va funcţiona. Lăsaţi sprayul nazal să se decongeleze timp de cel puţin o oră; nu îl utilizaţi în cazul în care conţinutul este încă congelat sau nu s-a decongelat complet. Congelarea nu afectează perioada de valabilitate a medicamentului.

Verificaţi periodic data de expirare și înlocuiţi produsul EURneffy înainte de data de expirare.

EURneffy 2 mg

(spray nazal cu adrenalină)

Instrucţiuni de utilizare corectă pentru pacienţi și îngrijitorii acestora

Acest ghid este conceput pentru a vă sfătui cu privire la ce trebuie să faceţi în cazul unei reacţii alergice severe sau anafilaxie. Atât pacienţii, cât și îngrijitorii acestora trebuie să se familiarizeze cu acest ghid pentru a se asigura că pot recunoaște simptomele unei reacţii alergice și că știu cum să administreze în siguranţă și eficient spray-ul nazal EURneffy 2 mg.



1. Prindere

Ţineţi spray-ul nazal ca în imaginea alăturată. Ţineţi sprayul nazal cu degetul mare pe partea de jos a pistonului și câte un deget de-o parte și de alta a duzei.

NU trageţi și nu împingeţi pistonul.
NU efectuaţi pulverizări prealabile sau de încercare; fiecare spray nazal conţine o singură doză.



2. Poziţionare

Introduceţi vârful sprayului nazal într-o nară până când degetele vă ating nasul. Ţineţi duza dreaptă în nas, îndreptată spre frunte.



3. Apăsaţi

Apăsaţi ferm pistonul în sus până când se declanșează și pulverizează în nară.

NU înclinaţi dispozitivul spre peretele interior sau exterior al nasului.

După utilizarea EURneffy

Solicitaţi imediat asistenţă medicală de urgenţă pentru monitorizarea atentă a episodului anafilactic și pentru cazul în care va fi necesar un tratament suplimentar. Dacă nu puteţi efectua apelul, rugaţi pe altcineva să sune în locul dumneavoastră.

Când utilizaţi EURneffy

Pacienţii trebuie să stea întinși pe spate, cu picioarele ridicate, dar trebuie să se ridice în șezut dacă au dificultăţi respiratorii. Pacienţii inconștienţi trebuie întinși pe o parte, în poziţia laterală de siguranţă pentru a preveni sufocarea. Dacă simptomele nu dispar, ar trebui să rămâneţi cu o altă persoană până primiţi asistenţă medicală.

Monitorizaţi simptomele

Dacă simptomele continuă să se agraveze sau reapar după aproximativ 10 minute sau în cazul oricărei erori de administrare, utilizaţi o a doua doză folosind un nou spray nazal EURneffy în aceeași nară.



Ce este EURneffy ?

EURneffy este un spray nazal cu adrenalină pentru adulţi și copii cu o greutate peste 30 kg, pentru tratamentul de urgenţă al reacţiilor alergice, inclusiv anafilaxie (reacţie alergică bruscă, severă, care pune uneori viaţa în pericol), cauzate de înţepături sau mușcături de insecte, alimente, medicamente și alţi alergeni (substanţe care provoacă alergii), precum și anafilaxia idiopatică (cauza alergiei nu este cunoscută) sau anafilaxia indusă de efortul fizic.

Materialele educaţionale pentru EURneffy , inclusiv o copie a prospectului și instrucţiunile de utilizare, sunt disponibile online www.EURneffy.eu

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct la Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România:
Str. Aviator Sănătescu nr. 48,
sector 1, Bucuresti, 011478- RO
e-mail: adr@anm.ro
Website: www.anm.ro
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. Reacţiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
PV.ro@biomapass.com
ALKPV.RO@biomapas.com

ALK